



# Macrocyctis Iron

CONCIME CE  
Soluzione di concime a base di ferro (solfato)

RAPIDA AZIONE  
RINVERDENTE

RIDUCE LO STRESS  
DA FENOMENI  
BIOTICI E ABIOTICI

SUPPORTA LO  
SVILUPPO RADICALE

## Composizione

Ferro (Fe) solubile in acqua 2%

## Caratteristiche

MACROCYSTIS IRON è un nutrimento per concimazione fogliare e trattamenti radicali che aiuta la crescita della pianta e l'incremento della produzione. Grazie alla sua particolare formulazione, contenente alga Macrocyctis Integrifolia, aiuta l'assimilazione del ferro e degli altri elementi nutritivi distribuiti con la normale fertilizzazione. E' prodotto a temperatura ambiente, senza l'uso di sostanze caustiche, con un processo che riduce al minimo le alterazioni dei contenuti naturali dell'alga. Può essere applicato a tutte le colture agricole: orticole, piante da frutto, tappeti erbosi, piante da fiore ed ornamentali.

## Dosi di impiego

### Coltura

### Impiego

BROCCOLO, CAVOLO, INSALATA, LATTUGA, POMODORO, CIPOLLA	1l/hl bagnare il contenitore prima del trapianto. 2l/ha applicare in post emergenza (4 foglie) e ripetere ogni 2 settimane
MELANZANA, MELONE, ANGIURIA	1l/hl bagnare il contenitore prima del trapianto. 2l/ha applicare all' emergenza (prima foglia) e ripetere ogni 2 settimane
CETRIOLO, PEPERONE, CAROTA	2l/ha applicare in post emergenza (3-4 foglie) e ripetere ogni 2 settimane; poi ripetere dopo ogni raccolta.
PATATA	1l/hl immergere la patata da seme per 5 minuti prima di piantare. 2l/ha applicare 3 settimane dopo l'emergenza, quindi 2 settimane dopo
FRAGOLA	1l/hl bagnare l'apparato radicale prima del trapianto in campo. 2l/ha applicare all'inizio della crescita e ripetere ogni 2 settimane.
FAGIOLO, PISELLO	2l/ha applicare in post-emergenza(4-6 foglie) e Ripetere 2 volte ad intervallo di 2 settimane.
POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, KIWI	250ml/hl bagnare il suolo intorno alla pianta 250ml/hl applicare in pre-fioritura e ripetere ogni 2/3 settimane almeno 3 volte.
VITE	250ml/hl applicare dopo la fioritura e ripetere ogni 2 settimane
PRATI, TAPPETI ERBOSI	2l/ha applicare nella fase iniziale di crescita e ripetere ogni mese. Eseguire ulteriori applicazioni dopo periodi di stress o forte uso.
PIANTE ORNAMENTALI	250ml/hl applicare alla formazione del germoglio e ripetere ogni 2 settimane
CEREALI	2l/ha applicare una volta post-emergenza (4-6 foglie)
COLTURE VIVAISTICHE	1l/hl innaffiare i vassoi a primavera e ripetere 3 settimane prima del trapianto
ALTRE COLTURE	2l/ha applicare 2 settimane post-emergenza e ripetere 2 volte ad intervallo di 2/3 settimane

## Confezione

Flacone da 1,1kg  
Tanica da 5kg



 Consentito in  
Agricoltura Biologica  
Reg. CE 834/2007

## Suggerimenti per un corretto impiego

Agitare il flacone prima dell'uso. Servirsi di attrezzature che assicurino una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione, utilizzando la soluzione ottenuta lo stesso giorno della preparazione. MACROCYSTIS IRON è compatibile con la gran parte dei prodotti per la nutrizione e la difesa delle piante; si consiglia comunque in caso di dubbio di eseguire un test di compatibilità prima dell'uso. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Non superare le dosi consigliate.